

Komplexní procvičení Wordu – Zoologická zahrada

☒ Základní psaní	☒ Formátování textu	☐ Tabulky	☒ Grafika v dokumentu
☒ Editace textu	☐ Odrážky a číslování	☐ Čáry a ohraničení	☒ Externí obrázky
☒ Nastavení stránky	☐ Styly	☐ Tabulátory	☒ Internet ve Wordu

Podle předlohy vytvořte zoologickou zahradu s osmi zvířaty a všechno navzájem propojte hypertextovými odkazy.

1. V zoologické zahradě bude osm zvířat, sedm je daných, poslední zvíře je podle vašeho výběru.
2. Každé zvíře bude mít svoji stránku ve Wordu, kde bude název, obrázek a krátký popis jeho vlastností.
3. Osmé zvíře vytvoříte podle vzoru předchozích zvířat.
4. Stránka s nadpisem Moje soukromá zoologická zahrada, představuje vstupní bránu do vaší zahrady. Osm čtverců s obrázky zvířat představuje osm klecí se zvířaty. A nezapomeňte zasadit palmy, ať mají zvířata nějakou zeleň.
5. Nadpis „Moje soukromá zoologická zahrada“ je vytvořen ve WordArtu.
6. Na obrázek zvířete vložte hypertextový odkaz, kterým se dostanete na stránku se zvířetem.
7. Dole na stránce je text ZOO. Na něj nastavte hypertextový odkaz, kterým se vrátíte na hlavní stránku se zvířaty. Šipka na druhé straně bude odkazovat do vedlejší klece se sousedním zvířetem. Tak jak umístíte zvířata vedle sebe do klecí, tak vždy nastavte odkaz na šipku. Pomocí šipek si budete moci projít po zvířatech celou zoologickou zahradu. Šipka u posledního zvířete bude odkazovat na první. Bude to takový uzavřený kruh.

Předlohy na dalších stranách

Lev (*Pantera leo*)



Délka: tělo 1,4-2 m, ocas 65-100 cm

Výskyt: Afrika jižně od Sahary, Střední východ, jižní Asie

Lvi žijí na savanách a v buši v rodinných smečkách. Smečku tvoří zpravidla až 3 samci, 15 samic a jejich mláďata. Lov je záležitostí lvic, které loví antilopy a zebry ve dvojicích nebo v malých skupinách. Úlohou vedoucího samce je bránit teritorium smečky.

Mrož (*Odobenus rosmarus*)



Délka: tělo 2,2-3,5 m

Výskyt: Severní ledový oceán, severní část Atlantského oceánu

Mroži žijí v Arktidě a živí se převážně měkkýši. Mají ostré kly, které používají při soubojích, a když se potřebují vytáhnout z vody na led. Čtyři ploché ploutve dělají z mrože skvělého plavce. Na souši se mrož pohybuje jen s obtížemi. Většinu dne tráví hromadným odpočinkem na ledě u vody.

Hroch (*Hyppopotamus amphibius*)



Délka: tělo 2,8-4,2 m, ocas 35-50 cm

Výskyt: Afrika jižně od Sahary

Patří k největším suchozemským savcům světa. Větší a těžší než on jsou jen nosorožec a slon. Žije na březích řek a jezer a každý den tráví až 16 hodin ve vodě, aby se ochladil. Při západu slunce se vydává na břeh za potravou. Spásá travu a požírá i spadlé plody rostlin. Umí výborně plavat, ale dává přednost chůzi po dně. Dokáže zadržet dech až na 5 minut.

Los (*Alces alces*)



Délka: tělo 2,5-3 m, ocas 5-12 cm

Výskyt: nejsevernější části Evropy, Asie a Severní Ameriky

Los je největším ze všech jelenovitých. Má mohutné lopatovité paroží, široký, převislý čenich a kožní lalok na hrdle. V zimě se živí borovými šiškami a kopyty rozhrabává sněh, aby se dostal k mechům a lišejníkům. Je dobrý plavec a v létě tráví hodiny ve vodě a pase se na vodních rostlinách. V době říje samci lákají samice troubením.

Želva sloní (*Geochelone nigra*)



Délka: až 1,2 m

Výskyt: Galapágy

Obrovská želva vážící i přes 215 kg. Samci jsou zpravidla větší než samice. Tato želva žije výhradně na souši a živí se téměř všemi rostlinami, na které narazí. Někteří jedinci mají krunýř nad hlavou prohnutý, aby dosáhli na vyšší rostliny. Samice zadníma nohama vyhrabává díru, do které klade až 17 vajec, jež zahrne zemí a nechá být. Mláďata se po vylíhnutí vyhrabou sama.

Varan (*Varanus komodoensis*)



Délka: až 3 m

Výskyt: ostrovy Komodo, Flores, Pintja a Padar, východní část Jávy

Největší dnes žijící ještěr, dost silný, aby ulovil jelena či divoké prase. Má mohutné tělo, dlouhý silný ocas a silné nohy s ostrými drápy. Navzdory velikosti a hmotnosti dobře šplhá a pohybuje se s překvapující rychlostí. Navíc je i dobrý plavec a často se zdržuje poblíž vody.

Kobra (*Naja naja*)



Délka: 1,8-2,2 m

Výskyt: Indie, střední a jihovýchodní Asie

Velký a prudce jedovatý had lovící hlavně hlodavce, menší plazy a žáby. Může útočit nebo se bránit na dálku vystříknutím dávky jedu. Pokud se jí podaří zasáhnout útočníka do očí, způsobí mu palčivou bolest a dočasnou slepotu. Nepřítele zastrašuje tím, že vztyčí přední část těla a roztažením krčních žeber vytvoří širokou kápi. Na její zadní straně je známá „brýlová“ kresba.

Moje soukromá zoologická zahrada

